ROYAUME DU MAROC

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2023

MATHÉMATIQUES

Yassine Elamri

Exercice 1 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n - 2}{2u_n + 5}$

0.5 **1 -** Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > -1$

Raisonnons par récurrence

✓ Pour $n = 0$; on a $u_0 = 0 > -1$, donc la propriété est vraie pour $n = 0$

✓ Supposons que $u_n > -1$ est montrons que $u_{n+1} > -1$

$$u_{n+1} - (-1) = u_{n+1} + 1 = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} + 1 = \frac{u_n - 2 + 2u_n + 5}{2u_n + 5} = \frac{3u_n + 3}{2u_n + 5} = \frac{3(u_n + 1)}{2u_n + 5}$$

Or d'après l'hypothèse on a $u_n > -1$ donc $u_n + 1 > 0$ et $2u_n > -2$

Donc $3(u_n + 1) > 0$ et $2u_n + 5 > 3 > 0$, d'où : $u_{n+1} + 1 > 0$ c.à.d. $u_{n+1} > -1$

✓ D'après le principe de la récurrence on a $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n > -1$

0.5 **2 -** Montrons que la suite (u_n) est décroissante, puis déduisons que (u_n) est convergente

✍ Montrons que la suite (u_n) est décroissante

Soit $n \in \mathbb{N}$, On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} - u_n = \frac{u_n - 2 - 2u_n^2 - 5u_n}{2u_n + 5} = \frac{-2u_n^2 - 4u_n - 2}{2u_n + 5} = \frac{-2(u_n + 1)^2}{2u_n + 5} < 0$$

Donc u_n est décroissante

✍ Déduisons que (u_n) est convergente

(U_n) est décroissante est minorée par -1, donc (u_n) est convergente

3 - On pose $v_n = \dfrac{3}{1 + u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

T than yesterday, tomorrow better than today

0.5 **a)** Montrons que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 puis déterminons son premier terme

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $v_{n+1} - v_n = \dfrac{3}{1+u_{n+1}} - \dfrac{3}{1+u_n}$

Or $1 + u_{n+1} = u_{n+1} + 1 = \dfrac{3(u_n+1)}{2u_n+5}$

Donc

$$v_{n+1} - v_n = \frac{3}{\frac{3(u_n+1)}{2u_n+5}} - \frac{3}{1+u_n} = \frac{2u_n+5}{u_n+1} - \frac{3}{1+u_n} = \frac{2u_n+5-3}{u_n+1} = \frac{2(u_n+1)}{u_n+1} = 2$$

D'où (v_n) est une suite arithmétique de raison 2

et de premier terme : $v_0 = \dfrac{3}{1+u_0} = \dfrac{3}{1+0}$

$v_0 = 3$

0.5 **b)** Exprimons u_n en fonction de n , pour tout n de $\mathbb{N}$ et déduisons la limite de (u_n)

✍ Exprimons u_n en fonction de n, pour tout n de $\mathbb{N}$

Soit n de $\mathbb{N}$

On a (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 3$ _ Donc son terme général s'écrit : $v_n = v_0 + rn = 3 + 2n$

Or $v_n = \dfrac{3}{1+u_n}$ donc $1 + u_n = \dfrac{3}{v_n}$ c.à.d. $u_n = \dfrac{3}{v_n} - 1$

D'où $u_n = \dfrac{3}{3+2n} - 1$

✍ Déduisons la limite de (u_n)

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{3+2n} - 1\right)$$

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -1$

Car $\lim\limits_{n\to+\infty} (3+2n) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{3+2n} = 0$

4 - On pose $w_n = \mathbf{e}^{3-v_n}$ et $S_n = w_0 + w_1 + w_2 + \cdots + w_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0.5 **a)** Montrons que (w_n) est une suite géométrique et déterminons sa raison et son premier terme

On a $\forall n \in \mathbb{N}$; $v_n = 2n + 3$, donc : $w_n = \mathbf{e}^{3-(2n+3)} = \mathbf{e}^{3-2n-3} = \mathbf{e}^{-2n}$; $\forall n \in \mathbb{N}$

On a $w_{n+1} = \mathbf{e}^{-2(n+1)} = \mathbf{e}^{-2n-2} = \mathbf{e}^{-2n}\mathbf{e}^{-2} = \mathbf{e}^{-2}\mathbf{e}^{-2n} = \mathbf{e}^{-2}w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $q = \mathbf{e}^{-2}$

Et de premier terme : $w_0 = \mathbf{e}^{-2\times 0} = \mathbf{e}^0 = 1$

0.5 **b)** Calculons la limite de la somme S_n

S_n est la somme de n termes successifs d'une suite géométrique (w_n) de raison $q = \mathbf{e}^{-2}$

Yassine Elamri

et de premier terme $w_0 = 1$

Donc :

$$S_n = w_0 + w_1 + \cdots + w_n = w_0 \times \left[\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right] = 1 \times \left[\frac{1-(\mathbf{e}^{-2})^{n+1}}{1-\mathbf{e}^{-2}}\right] = \frac{1-(\mathbf{e}^{-2})^{n+1}}{1-\mathbf{e}^{-2}}$$

Par suite : $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1-(\mathbf{e}^{-2})^{n+1}}{1-\mathbf{e}^{-2}}$

Alors $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \dfrac{1}{1-\mathbf{e}^{-2}}}$

Car $-1 < \mathbf{e}^{-2} < 1$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (\mathbf{e}^{-2})^{n+1} = 0$

Exercice 2 : (3 pts)

L'espace rapporté à un repère orthonormé direct $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, soient les points $A\,(2;1;2)$, $B\,(-2;0;5)$, $C\,(4;-5;7)$ et $\Omega\,(1;-1;0)$

Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon $R = 3$

On pose $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$

0.5 **1 - a)** Montrons que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}$ et déduisons que les points A, B et C ne sont pas alignés

On a : $\overrightarrow{AB}\,(-4;-1;3)$ et $\overrightarrow{AC}\,(2;-6;5)$

D'où : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} -1 & -6 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -6 \end{vmatrix}\vec{k}$

$= (-5+18)\vec{i} - (-20-6)\vec{j} + (24+2)\vec{k}$

$= 13\vec{i} + 26\vec{j} + 26\vec{k}$

$= 13\left(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}\right)$

On a $\overrightarrow{\Omega A}\,(2-1;1-(-1);2-0)$

Donc $\overrightarrow{\Omega A}\,(1;2;2)$ Alors $\vec{u}\,(1;2;2)$ par conséquence : $\boxed{\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}}$

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{O}$, donc $\boxed{\text{les points } A, B \text{ et } C \text{ ne sont pas alignés}}$

0.25 **b)** Vérifions que $x + 2y + 2z - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

L'équation cartésienne du plan (ABC) s'écrit : $(ABC) : ax + by + cz + d = 0$

Et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\,(1;2;2)$ est un vecteur normal au plan (ABC), donc $(ABC) : x+2y+2z+d = 0$

Or $A \in (ABC)$, donc $x_A + 2y_A + 2z_A + d = 0$, c.à.d. $2 + 2 + 4 + d = 0$

Donc $d = -8$

Par conséquence $\boxed{(ABC) \ : \ x + 2y + 2z - 8 = 0}$

0.5 **c)** Montrons que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point A

Yassine Elamri

On a $d(\Omega;(ABC)) = \dfrac{|x_\Omega + 2y_\Omega + 2z_\Omega - 8|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}} = \dfrac{|1+2\times(-1)+2\times 0-8|}{\sqrt{9}} = \dfrac{|1-2-8|}{3} = \dfrac{|-9|}{3} = 3 = R$

Donc le plan (ABC) est tangent à la sphère (S)

Et puisque $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$ est un vecteur normal au plan (ABC), alors A est le projeté orthogonal de Ω sur le plan (ABC) Donc (ABC) est tangent à (S) au point A

2 - Soient (P) le plan d'équation $3x+4y+z+1=0$ et (Δ) la droite passant par A et orthogonale au plan (P)

0.5 **a)** Montrons que (Δ) coupe (P) au point $H\left(\frac{1}{2};-1;\frac{3}{2}\right)$

On a $(P): 3x+4y+z+1=0$, donc $\vec{v}(3;4;1)$ est un vecteur normal au plan (P)

Et puisque $(P)\perp(\Delta)$, donc $\vec{v}$ est un vecteur directeur de la droite (Δ) passant par $A(2;1;2)$

Donc une représentation paramétrique de (Δ) s'écrit : $(\Delta): \begin{cases} x = 2+3t \\ y = 1+4t \\ z = 2+t \end{cases} ; t\in\mathbb{R}$

$$M(x;y;z)\in(\Delta)\cap(P) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+4y+z+1=0 \\ x = 2+3t \\ y = 1+4t \\ z = 2+t \end{cases} ; t\in\mathbb{R}$$

$\Leftrightarrow 3(2+3t)+4(1+4t)+2+t+1=0 \Leftrightarrow 26t+13=0 \Leftrightarrow t=-\dfrac{1}{2}$

Donc (Δ) coupe (P) en un seul point H de coordonnées : $\begin{cases} x_H = 2+3\times\dfrac{-1}{2} = \dfrac{1}{2} \\ y_H = 1+4\times\dfrac{-1}{2} = -1 \\ z_H = 2-\dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2} \end{cases}$

D'où $H(\frac{1}{2};-1;\frac{3}{2})$ est le point d'intersection de (Δ) et (P)

0.5 **b)** Déterminons les coordonnées de D tel que H soit milieu de $[AD]$

H est le milieu du segment $[AD]$

Donc : $x_H = \dfrac{x_A+x_D}{2}$ et $y_H = \dfrac{y_A+y_D}{2}$ et $z_H = \dfrac{z_A+z_D}{2}$

Donc : $\dfrac{1}{2} = \dfrac{2+x_D}{2}$ et $-1 = \dfrac{1+y_D}{2}$ et $\dfrac{3}{2} = \dfrac{2+z_D}{2}$

Donc : $1 = 2+x_D$ et $-2 = 1+y_D$ et $3 = 2+z_D$

Donc : $x_D = -1$ et $y_D = -3$ et $z_D = 1$

Alors $D(-1;-3;1)$

3 - Soit (Q) le plan passant par le point D et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}$

0.25 **a)** Montrons que le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D

Yassine Elamri

On a $\overrightarrow{\Omega D}$ est un vecteur normal au plan (Q) et $D \in (Q)$, alors $d(\Omega,(Q)) = \Omega D$

Et puisque : $\Omega D = \sqrt{(-1-1)^2+(-3+1)^2+(1-0)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$

Donc $d(\Omega,(Q)) = \Omega D = 3 = R$ donc le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D

(car D est le projeté orthogonal de Ω sur (Q))

0.5 **b)** Montrons que les plans (Q) et (ABC) se coupent suivant la droite (BC)

On a le plan (ABC) est de vecteur normal $\vec{u}(1;2;2)$, et le plan (Q) est de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}(-2;-2;1)$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires (car il n'existe pas de réel k tel que $\vec{u} = k\overrightarrow{\Omega D}$)

Donc les plan (Q) est (ABC) sont sécantes

Soit $M(x;y;z)$ un point de l'espace

$M \in (Q) \Leftrightarrow \overrightarrow{MD}.\overrightarrow{\Omega D} = 0 \Leftrightarrow -2(-1-x)-2(-3-y)+1-z = 0$

$\Leftrightarrow 2+2x+6+2y+1-z = 0$

$\Leftrightarrow 2x+2y+z+9 = 0$ (c'est une équation cartésienne de (Q))

Montrons que $B \in (Q)$ et $C \in (Q)$

On $2x_B+2y_B+z_B+9 = -4+0-5+9 = 0$, et $2x_C+2y_C+z_C+9 = 8-10-7+9 = 0$

Donc $B \in (Q)$ et $C \in (Q)$

Et puisque B et C sont deux points distincts appartiens au plans (ABC) et (Q)

Alors les plans (Q) et (ABC) se coupent suivant la droite (BC)

Exercice 3 : (3 pts)

1 - On considère le nombre complexe : $a = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{3}{2}i$

0.25 **a)** Montrons que $a = \sqrt{3}\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

On a : $a = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{3}{2}i$, donc $|a| = \sqrt{\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\dfrac{3}{4}\right) + \left(\dfrac{9}{4}\right)} = \sqrt{\left(\dfrac{12}{4}\right)} = \sqrt{3}$

D'où : $a = \sqrt{3}\left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{3}{2\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}\left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Donc : $a = \sqrt{3}\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

0.25 **b)** Déduisons que a^{2022} est un nombre réel

On a : $a = \sqrt{3}\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$, donc $a^{2022} = \left[\sqrt{3}\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)\right]^{2022}$

$a^{2022} = \sqrt{3}^{2022}\left(\cos\dfrac{2022\pi}{3} + i\sin\dfrac{2022\pi}{3}\right)$

$a^{2022} = \left(\sqrt{3}^2\right)^{1011}(\cos 674\pi + i\sin 674\pi)$

$a^{2022} = 3^{1011}(1 + i\times 0) = 3^{1011} \in \mathbb{R}$

Donc a^{2022} est un nombre réel

Yassine Elamri

Today better than yesterday https://steinmath.com better than today

2 - On considère les points $A(a)$ et $B(\bar{a})$ dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $\left(O, \vec{u}, \vec{v}\right)$

0.5 Déterminons une mesure de l'angle de la rotation R de centre O et qui transforme B en A

R est la rotation de centre O et d'angle θ et qui transforme B en A

Donc : $R(B) = A$ signifie $z_A - z_O = \mathbf{e}^{i\theta}(z_B - z_O)$

donc $\mathbf{e}^{i\theta} = \dfrac{z_A}{z_B}$, c.à.d. $\mathbf{e}^{i\theta} = \dfrac{a}{\bar{a}}$, donc $\mathbf{e}^{i\theta} = \dfrac{\sqrt{3}\mathbf{e}^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{3}\mathbf{e}^{-i\frac{\pi}{3}}}$, donc $\mathbf{e}^{i\theta} = \mathbf{e}^{i\frac{\pi}{3}+i\frac{\pi}{3}}$, donc $\mathbf{e}^{i\theta} = \mathbf{e}^{i\frac{2\pi}{3}}$

Donc $\boxed{\dfrac{2\pi}{3} \text{ est une mesure de l'angle de la rotation } R}$

3 - Considérons dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(E_\alpha) : z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\alpha \neq 0$

Soient z et $\bar{z}$ les deux racines complexes conjuguées non réelles de l'équation E_α

Soient les points $M(z)$, $N(\bar{z})$ et $P(\sqrt{3})$ du plan complexe

0.5 **a)** Justifions que $\alpha > \dfrac{3}{4}$ et que $\alpha = z\bar{z}$

Pour que l'équation (E_α) admet deux racines complexes conjuguées, il faut que son discriminant Δ soit strictement inférieur à 0, c.à.d. $\Delta < 0$

c.à.d. $(-\sqrt{3})^2 - 4\alpha < 0$, donc $3 - 4\alpha < 0$, donc $3 < 4\alpha$

Alors : $\boxed{\alpha > \dfrac{3}{4}}$

Et on a $\boxed{z\bar{z} = \dfrac{\alpha}{1} = \alpha}$ (le produit des solutions z_1 et z_2 d'une équation de deuxième degré de type $az^2 + bz + c = 0$ est égale à $z_1 \times z_2 = \dfrac{c}{a}$)

0.5 **b)** Montrons que : $|z| = \left|z - \sqrt{3}\right|$

L'équation (E_α) admet deux solutions z et $\bar{z}$

Alors $z + \bar{z} = \dfrac{-(-\sqrt{3})}{1} = \sqrt{3}$ (la somme des solutions z_1 et z_2 d'une équation de deuxième degré de type $az^2 + bz + c = 0$ est égale à $z_1 + z_2 = \dfrac{-b}{a}$)

D'où : $\bar{z} = \sqrt{3} - z$, donc $|\bar{z}| = \left|\sqrt{3} - z\right|$

Et comme $|\bar{z}| = |z|$ et $\left|\sqrt{3} - z\right| = \left|z - \sqrt{3}\right|$

Donc $\boxed{|z| = \left|z - \sqrt{3}\right|}$

0.5 **c)** Déduisons que M et N appartiennent à (Δ) la médiatrice de $[OP]$

On a $|z| = \left|z - \sqrt{3}\right|$, donc $|z - 0| = |z - z_P|$, alors $OM = PM$, D'où M appartient à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

Et on a $|z| = \left|z - \sqrt{3}\right|$ donc $|\bar{z}| = \left|\overline{z - \sqrt{3}}\right|$, donc $|\bar{z}| = \left|\bar{z} - \sqrt{3}\right|$ donc $ON = NP$, alors N appartient à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

Finalement $\boxed{M \text{ et } N \text{ appartiennent à la médiatrice } (\Delta) \text{ du segment } [OP]}$

0.5 **d)** Déterminons la valeur de α pour laquelle $\left|z - \sqrt{3}\right| = \sqrt{3}$ et déduisons dans ca cas les points d'intersection de (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

✍ On a $\left|z - \sqrt{3}\right| = \sqrt{3}$ et on a $|z| = \left|z - \sqrt{3}\right|$, donc $|z| = \sqrt{3}$

Yassine Elamri

Et puisque $\alpha = z\bar{z}$ et $z\bar{z} = |z|^2$, donc $\alpha = |z|^2 = \sqrt{3}^2$

Donc $\boxed{\alpha = 3}$

✍ On a $M(z) \in (\Delta)$, donc $\left|z - \sqrt{3}\right| = \sqrt{3}$, donc $|z_M - z_P| = \sqrt{3}$, donc $MP = \sqrt{3}$


Et on a $N(\bar{z}) \in (\Delta)$, donc $\left|\bar{z} - \sqrt{3}\right| = \sqrt{3}$, donc $|z_N - z_P| = \sqrt{3}$, donc $NP = \sqrt{3}$

D'où les points M et N appartiennent au cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Par conséquence $\boxed{M \text{ et } N \text{ sont les pointes d'intersection de la droite } (\Delta) \text{ et le cercle de centre } P \text{ et de rayon } \sqrt{3}}$

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient *quatre* boules blanches et *deux* boules noires, indiscernables au toucher



Dans cette exercice, on va utiliser les combinaisons C_n^p

1 - On tire au hasard et simultanément *deux* boules de l'urne

On a $Card(\Omega) = C_6^2 = \dfrac{6!}{2!(6-2)!} = \dfrac{6!}{2!4!} = \dfrac{6 \times 5 \times 4!}{2!4!} = \dfrac{30}{2} = 15$

0.5 **a)** Calculons la probabilité de l'événement A : " Tirer au moins une boule noire "

L'événement A est équivalent a tirer deux boules noires ou une boule noir et une boule blanche

$p(A) = \dfrac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \dfrac{C_2^1 C_4^1 + C_2^2}{15} = \dfrac{2 \times 4 + 1}{15} = \dfrac{9}{15}$

Donc $\boxed{p(A) = \dfrac{3}{5}}$

0.5 **b)** Soit l'événement B : " Obtenir *deux* boules de même couleur ". Montrer que $p(B) = \dfrac{7}{15}$

L'événement B est équivalent a tirer deux boules noires ou deux boule blanches

$p(B) = \dfrac{Card(B)}{Card(\Omega)} = \dfrac{C_2^2 + C_4^2}{15} = \dfrac{1 + 6}{15}$

Donc $\boxed{p(B) = \dfrac{7}{15}}$

c) On répète cette expérience **cinq** fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage

0.5 Quelle est la probabilité pour que l'événement B soit réalisé trois fois

On va utiliser une variable aléatoire binomiale Y de paramètres $n = 5$ et $p = \dfrac{7}{15}$

Yassine Elamri

$$p(Y=3) = C_5^3 p(B)^3 (1-p(B))^2 = 10 \times \left(\frac{7}{15}\right)^3 \left(1-\frac{7}{15}\right)^2$$

$$p(Y=3) = 10 \times \left(\frac{7}{15}\right)^3 \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{10 \times 7^3 \times 8^2}{15^3 \times 15^2}$$

Donc $\boxed{p(Y=3) = \frac{43904}{158875}}$

2 - Dans cette question, on tire des boules de l'urne, une après l'autre et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule *blanche* pour la première fois

Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages effectués dans cette expérience

0.25 **a)** Justifions que les valeurs prises par X sont : 1 ; 2 et 3

➥ Si la première boule tirée est blanche, on arrête donc l'expérience au premier tirage, donc X peut avoir la valeur 1

➥ Si la première boule tirée est noire et la seconde est blanche, on arrête donc l'expérience au deuxième tirage, donc X peut avoir la valeur 2

➥ Si les deux premières boules tirées sont noire, Alors **forcément la troisième est blanche**, on arrête donc l'expérience au troisième tirage, donc X peut avoir la valeur 3

D'où : $\boxed{X(\Omega) = \{1;2;3\}}$

0.25 **b)** Montrons que $p(X=2) = \frac{4}{15}$

$X=2$ signifie que la première boule tirée est noire et la seconde boule tirée est blanche

$p(X=2) = \frac{A_2^1 A_4^1}{A_6^2} = \frac{2 \times 4}{30} = \frac{8}{30}$, donc $\boxed{p(X=2) = \frac{4}{15}}$

0.5 **c)** Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X

➠ $X=1$ signifie que la première boule tirée est blanche : $p(X=1) = \frac{A_4^1}{A_6^1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

➠ $X=2$ Déja calculé dans la question précédente : $p(X=2) = \frac{4}{15}$

➠ $X=3$ signifie que les deux premières boules tirées sont noires et la troisième boule tirée est blanche : $p(X=3) = \frac{A_2^1}{A_6^1} \times \frac{A_1^1}{A_5^1} \times \frac{A_4^1}{A_4^1} = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{1} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

x_i	1	2	3
$p(X=x_i)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$

0.5 **d)** Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire ?

La probabilité d'obtenir au moins une boule noire c'est équivalente à avoir une ou deux boules noires, c.à.d. $X=2$ ou $X=3$

Donc $p = p(X=2) + p(X=3) = \frac{4}{15} + \frac{1}{15} = \frac{5}{15}$

Yasine Elamri

Alors $\boxed{p = \frac{1}{3}}$

Problème : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x) = (x-1)^2 \mathbf{e}^{x(2-x)} \ ; \ x \leq 2 \\ f(x) = 1 + (x-2)^2 \ln(x-2) \ ; \ x > 2 \end{cases}$

Soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\left(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}\right)$(unité : 1 cm)

0.5 **1 -** Montrons que la fonction f est continue au point 2

On a f est continue à gauche de 2 et on a $f(2) = 1$

Et on a : $\lim\limits_{\substack{x \to 2 \\ x>2}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to 2 \\ x>2}} (1 + (x-2)^2 \ln(x-2))$

On pose : $X = x - 2$ (si $x \to 2^+$ alors $X \to 0^+$)

On obtient : $\lim\limits_{\substack{x \to 2 \\ x>2}} f(x) = \lim\limits_{\substack{X \to 0 \\ X>0}} (1 + X^2 \ln X) = 1 = f(2)$ (car $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} X^n \ln X = 0$)

D'où f est continue à droite de 2

Par suite $\boxed{f \text{ est continue au point 2}}$

0.25 **2 - a)** Vérifions que pour tout $x < 2$ et $x \neq 0$; $\dfrac{f(x) - f(2)}{x-2} = x\mathbf{e}^{x(2-x)} - x.\dfrac{\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}$

Soit x un réel non nul tel que : $x < 2$

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} &= \frac{(x-1)^2\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x-2} \\ &= \frac{x^2\mathbf{e}^{x(2-x)} - 2x\mathbf{e}^{x(2-x)} + \mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x-2} \\ &= \frac{(x^2-2x)\mathbf{e}^{x(2-x)}}{x-2} + \frac{\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x-2} \\ &= \frac{x(x-2)\mathbf{e}^{x(2-x)}}{x-2} - x.\frac{\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \\ &= x\mathbf{e}^{x(2-x)} - x.\frac{\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\dfrac{f(x) - f(2)}{x-2} = x\mathbf{e}^{x(2-x)} - x.\dfrac{\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}}$

0.5 **b)** Montrons que f est dérivable à gauche en 2

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{\substack{x \to 2 \\ x<2}} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} &= \lim_{\substack{x \to 2 \\ x<2}} x\mathbf{e}^{x(2-x)} - x.\frac{\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \\ &= 2\mathbf{e}^0 - 2 \left(\text{Car } \lim_{\substack{x \to 2 \\ x<2}} \frac{\mathbf{e}^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} = 1 \quad \text{Avec } \lim_{\substack{x \to 0 \\ x<0}} \frac{\mathbf{e}^X - 1}{X} = 1 \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $\boxed{f \text{ est dérivable à gauche en 2 et on a : } f'_g(2) = 0}$

0.75 **c)** Montrons que f est dérivable en 2 et que $f'(2) = 0$ puis interpréter géométriquement le résultat

Yassine Elamri

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ x>2}}\frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{\substack{x\to 2\\ x>2}}\frac{1+(x-2)^2\ln(x-2)-1}{x-2}$$

On a $= \dfrac{(x-2)^2\ln(x-2)}{x-2}$

$= \lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}}(x-2)\ln(x-2)$

$= 0$(on posant $X = x-2$))

Donc f est dérivable à droite en 2 et on a : $f'_d(2) = 0$

Conclusion : f est dérivable à droite et à gauche en 2 et $f'_g(2) = f'_d(2) = 0$

Donc f est dérivable en 2 et $f'(2) = 0$

Par conséquence $(\mathcal{C})$ admet une tangente horizontale au point $I(2; f(2))$

0.25 **3 - a)** Vérifions que pour tout $x \leq 2$, $f(x) = x(x-2)\mathbf{e}^{x(2-x)} + \mathbf{e}^{x(2-x)}$

Soit $x \leq 2$

On a $f(x) = (x-1)^2\mathbf{e}^{x(2-x)}$

$= x^2\mathbf{e}^{x(2-x)} - 2x\mathbf{e}^{x(2-x)} + \mathbf{e}^{x(2-x)}$

$= (x^2-2x)\mathbf{e}^{x(2-x)} + \mathbf{e}^{x(2-x)}$

Donc $f(x) = x(x-2)\mathbf{e}^{x(2-x)} + \mathbf{e}^{x(2-x)}$

0.5 **b)** Calculons $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et interprétons géométriquement le résultat

On a $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(x(x-2)\mathbf{e}^{x(2-x)} + \mathbf{e}^{x(2-x)}\right)$

On pose $X = x(2-x)$ (si $x \to -\infty$ alors $X \to -\infty$)

Alors : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{X\to-\infty}(-X\mathbf{e}^X + \mathbf{e}^X) = 0$ (Car $\lim\limits_{x\to-\infty} x\mathbf{e}^x = \lim\limits_{x\to-\infty}\mathbf{e}^x = 0$)

Donc $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $-\infty$

0.75 **c)** Calculons $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}(1+(x-2)^2\ln(x-2)) = +\infty$

Car $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-2) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x-2) = +\infty$

Et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+(x-2)^2\ln(x-2)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{(x-2)^2}{x}\ln(x-2)\right) = +\infty$

D'où $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x} = +\infty$ Car $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x-2)^2}{x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x-2) = +\infty$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

0.5 **4 - a)** Montrons que pour tout $x < 2$, $f'(x) = 2x(x-1)(2-x)\mathbf{e}^{x(2-x)}$

Soit $x < 2$; on a $f(x) = (x-1)^2\mathbf{e}^{x(2-x)}$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et composé des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et on a

Yassine Elamri

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left((x-1)^2\mathbf{e}^{x(2-x)}\right)' \\
&= \left((x-1)^2\right)'\mathbf{e}^{x(2-x)} + (x-1)^2\left(\mathbf{e}^{x(2-x)}\right)' \\
&= 2(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)} + (x-1)^2\left(x(2-x)\right)'\mathbf{e}^{x(2-x)} \\
&= 2(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)} + (x-1)^2(-2x+2)\mathbf{e}^{x(2-x)} \\
&= 2(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)} - 2(x-1)^2(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)} \\
&= (x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)}\left(2-2(x-1)^2\right) \\
&= \left(2-2(x-1)^2\right)(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)} \\
&= \left(2-2(x^2-2x+1)\right)(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)} \\
&= (2-2x^2+4x-2)(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)} \\
&= (-2x^2+4x)(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)}
\end{aligned}$$

Donc $\boxed{f'(x) = 2x(2-x)(x-1)\mathbf{e}^{x(2-x)}}$

0.5 **b)** Montrons que pour tout $x > 2$, $f'(x) = (x-2)(1+2\ln(x-2))$

Soit $x > 2$, On a $f(x) = 1 + (x-2)^2\ln(x-2)$

f est dérivable sur $]2;+\infty[$ comme produit et composé de fonctions dérivables sur $]2;+\infty[$

et on a

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(1+(x-2)^2\ln(x-2)\right)' \\
&= 0 + \left((x-2)^2\right)'\ln(x-2) + (x-2)^2\left(\ln(x-2)\right)' \\
&= 2(x-2)\ln(x-2) + (x-2)^2\frac{1}{x-2} \\
&= 2(x-2)\ln(x-2) + (x-2)
\end{aligned}$$

Donc $\boxed{f'(x) = (x-2)\left(2\ln(x-2)+1\right)}$

0.5 **c)** Résolvons dans l'intervalle $]2;+\infty[$, l'inéquation $1+2\ln(x-2) \leq 0$

$$\begin{aligned}
1+2\ln(x-2) < 0 &\Leftrightarrow 2\ln(x-2) \leq -1 \\
&\Leftrightarrow \ln(x-2) \leq \frac{-1}{2} \\
&\Leftrightarrow x-2 \leq \mathbf{e}^{\frac{-1}{2}} \\
&\Leftrightarrow x \leq \mathbf{e}^{\frac{-1}{2}} + 2 \\
&\Leftrightarrow x \leq 2 + \frac{1}{\sqrt{\mathbf{e}}}
\end{aligned}$$

Donc $S = \left]-\infty; 2+\frac{1}{\sqrt{\mathbf{e}}}\right] \cap]2;+\infty[$

D'où $\boxed{S = \left]2; 2+\frac{1}{\sqrt{\mathbf{e}}}\right]}$

0.75 **d)** Étudions le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dressons le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

➥ Sur l'intervalle $]-\infty;2[$ on a $(2-x)\mathbf{e}^{x(2-x)} > 0$ et on a :

x	$-\infty$		0		1		2
$2x(x-1)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Alors

Yassine Elamri

x	$-\infty$		0		1		2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

➥ Sur l'intervalle $]2;+\infty[$ on a $x-2>0$, alors le signe de $f'(x)$ est celui de $1+2\ln(x-2)$

et on a :

x	2		$2+\frac{1}{\sqrt{e}}$		$+\infty$
$1+2\ln(x-2)$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	


Le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$ est :

x	$-\infty$		0		1		2		$2+\frac{1}{\sqrt{e}}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
f	0	↗	1	↘	0	↗	1	↘	$f\left(2+\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$	↗	$+\infty$

1

5 - Construisons la courbe $(\mathcal{C})$ dans le repère $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

(On donne : $f(3)=1$; $2+\frac{1}{\sqrt{e}}\approx 2.6$ et $f\left(2+\frac{1}{\sqrt{e}}\right)\approx 0.8$)



6 - Soit $\lambda\in]2;3[$

0.5

a) Montrons, en utilisant une intégration par partie, que :

$$\int_{\lambda}^{3}(x-2)^2\ln(x-2)\mathrm{d}x=-\frac{1}{9}+\frac{1}{3}(\lambda-2)^3\left(\frac{1}{3}-\ln(\lambda-2)\right)$$

On pose : $U(x)=\ln(x-2)$ et $V'(x)=(x-2)^2$

Yassine Elamri

Alors : $U'(x) = \dfrac{1}{x-2}$ et $V(x) = \dfrac{(x-2)^3}{3}$

D'après la formule de l'intégration par partie :

$$\begin{aligned}
\int_\lambda^3 (x-2)^2 \ln(x-2)\mathrm{d}x &= \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \ln(x-2)\right]_\lambda^3 - \frac{1}{3}\int_\lambda^3 (x-2)^2\mathrm{d}x \\
&= \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \ln(x-2)\right]_\lambda^3 - \frac{1}{9}\left[(x-2)^3\right]_\lambda^3 \\
&= \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \ln(x-2) - \frac{1}{9}(x-2)^3\right]_\lambda^3 \\
&= \frac{1}{3}\times 1^3 \ln 1 - \frac{1}{9}\times 1^3 - \left(\frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \ln(\lambda-2) - \frac{1}{9}(\lambda-2)^3\right) \\
&= 0 - \frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3\left(\frac{1}{3} - \ln(\lambda-2)\right)
\end{aligned}$$

Donc $\boxed{\int_\lambda^3 (x-2)^2 \ln(x-2)\mathrm{d}x = -\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3\left(\frac{1}{3} - \ln(\lambda-2)\right)}$

0.5 **b)** Déduisons, en fonction de λ, l'aire $\mathcal{A}(\lambda)$ de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C})$ et les droites d'équations : $y = 1$; $x = \lambda$ et $x = 3$

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\lambda) &= \int_\lambda^3 |f(x) - y|\mathrm{d}x \quad ua \\
&= \int_\lambda^3 \left|1 + (x-2)^2 \ln(x-2) - 1\right|\mathrm{d}x \quad ua \ (\text{car } [\lambda;3] \subset]2;+\infty[) \\
&= \int_\lambda^3 \left|(x-2)^2 \ln(x-2)\right|\mathrm{d}x \ u.a
\end{aligned}$$

Et on a $x \in [\lambda;3]$ c.à.d. $\lambda \leqslant x \leqslant 3$ donc $\lambda - 2 \leqslant x - 2 \leqslant 1$ donc $\ln(x-2) < 0$

D'où $\mathcal{A}(\lambda) = -\displaystyle\int_\lambda^3 (x-2)^2 \ln(x-2)\mathrm{d}x \ u.a$

Donc $\boxed{\mathcal{A}(\lambda) = \left[\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3\left(\ln(\lambda-2) - \frac{1}{3}\right)\right] cm^2}$

0.25 **c)** Calculons $\lim\limits_{\substack{\lambda\to 2\\ \lambda>2}} \mathcal{A}(\lambda)$

$$\begin{aligned}
\lim_{\substack{\lambda\to 2\\ \lambda>2}} \mathcal{A}(\lambda) &= \lim_{\substack{\lambda\to 2\\ \lambda>2}} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3\left(\ln(\lambda-2) - \frac{1}{3}\right)\right) \\
&= \lim_{\substack{\lambda\to 2\\ \lambda>2}} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \ln(\lambda-2) - \frac{1}{9}(\lambda-2)^3\right)
\end{aligned}$$

On pose $\gamma = \lambda - 2$ (si $\lambda \to 2^+$ alors $\gamma \to 0^+$)

On obtient $\lim\limits_{\substack{\lambda\to 2\\ \lambda>2}} \mathcal{A}(\lambda) = \lim\limits_{\substack{\gamma\to 0\\ \gamma>0}} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}\gamma^3 \ln\gamma - \frac{1}{9}\gamma^3\right)$

$\boxed{\lim\limits_{\substack{\lambda\to 2\\ \lambda>2}} \mathcal{A}(\lambda) = \frac{1}{9}}$ $\left(\text{car } \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln x = 0\right)$

FIN

Yassine Elamri